




GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais - CEGdRA

RELATÓRIO DE **QUEIMADAS** **ESTADO DO ACRE**



UNIDADE DE SITUAÇÃO
MONITORAMENTO
HIDROMETEOROLÓGICO



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais - CEGdRA

Presidente da Comissão

Carlos Edegard de Deus

Vice-Presidente

Magaly da Fonseca e Silva Taveira Medeiros

UNIDADE DE SITUAÇÃO

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Este monitoramento tem como objetivo apresentar dados referentes às queimadas e aos incêndios florestais na Amazônia Legal e no Estado do Acre, usando o Satélite de Referência AQUA MT-INPE. Este relatório contém o resumo diário do monitoramento de focos de calor, risco de fogo no estado do Acre, segundo dados do CPTEC/ INPE.

Coordenação

Vera Lúcia Reis

Elaboração

Tatiane Mendonça de Lima

Ylza Marluce Silva de Lima

Alan dos Santos Pimentel

Colaboradores

Erikis Fernando Pereira

Júlio César de Negreiros Morais

Edvaldo de Araujo Paiva

James Joyce Bezerra Gomes

Instituições Parceiras

INPE, CEMADEN, CBMAC,
UFAC, CPTEC, SIPAM, ANA



cegdra@gmail.com



68 3213-3156



Rua das Acácias nº 279 Distrito Industrial
CEP 69920-175 - Rio Branco
Acre - Brasil

Realização

SEMA/IMC

Apoio

FUNTAC

Nº44

18/09/2018

www.imc.ac.gov.br




1. Situação Meteorológica

"A previsão climática indica tendência de aquecimento anômalo no oceano Pacífico Equatorial, área do Niño 3.4, com possível estabelecimento do fenômeno El Niño no final do trimestre. Quanto ao Atlântico, os modelos discordam em relação ao seu comportamento futuro. No momento, as áreas de monitoramento do Atlântico Tropical norte e sul encontram-se em condições de neutralidade" (Sipam, 2018).

Diante deste cenário, o prognóstico para o **trimestre setembro, outubro e novembro de 2018** é de precipitação dentro da normal climatológica e de temperaturas próximas aos valores médios climatológicos (Sipam, 2018).

Figura 1 – Climatologia da precipitação (mm) máxima e mínima para os meses de setembro, outubro e novembro/2018



Fonte: Dados do CPC/NCEP processados pelo Sipam.




2. Condições de Seca no Estado do Acre


A Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre realiza o **monitoramento das condições de seca** no estado do Acre, através dos dados e análises do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – Cemaden, considerando a maior frequência de secas no estado, a exemplo dos anos de 2005, 2010 e 2016.

Segundo o Cemaden (2018), “a seca é considerada um fenômeno natural e recorrente em algumas regiões do Brasil, sendo caracterizada como uma ameaça natural à medida em que ocorre de forma intensiva e extensiva em áreas densamente povoadas, podendo resultar em desastre quando as capacidades locais são insuficientes para evitar danos significativos e perdas socioeconômicas”.

O Índice Integrado de Seca - ISS de julho observado na Figura 2 A indica uma **amenização da situação de seca no estado do Acre em relação ao mês de agosto** exibido na Figura 2 B. Verifica-se que as áreas identificadas no mês julho em condições de seca severa e moderada passaram a ser classificadas como **seca fraca no mês de agosto**.



A **Figura 3** representa o Índice Integrado de Seca - ISS da vegetação com condição de estresse hídrico para o **mês de agosto**, as **regiões central e oeste** do estado **permanecem em condição de estresse hídrico** apesar dos acumulados de chuva, o que ocorre em razão da recorrência de meses com chuva abaixo do normal (meses do primeiro semestre do ano).






3. Monitoramento de Focos de Calor – Amazônia Legal


A **Figura 4** apresenta o gráfico de acumulado de focos de calor na Amazônia Legal entre **(01/01/2018)** a **(17/09/2018)**. Foram registrados **56.978** focos de calor segundo o satélite de referência (AQUA_M-T), dos quais 25.0% localiza-se no estado do Mato Grosso (14.233), 14.3% no Pará (8.175) e 14.1% no Amazonas (8.043). O Acre ocupa o 7º lugar no ranque, com 5.165 focos de calor.

Figura 4 – Distribuição percentual dos focos de calor acumulados em **01/01/2018** a **17/09/2017** na Amazônia legal (Satélite de Referência AQUA Tarde)



A **Figura 5** abaixo indica a distribuição dos focos de calor no ano de 2018 na Amazônia Legal em comparação aos anos de 2005, 2010 e 2016.

Figura 5 – Distribuição comparativa dos focos de calor acumulados de **01/01/2018** a **17/09/2018** na Amazônia legal, nos anos de 2005, 2010, 2016 e 2018 (Satélite de Referência AQUA Tarde)






4. Monitoramento de Focos de Calor – Estado do Acre


A **Figura 6** demonstra o quantitativo de focos de calor acumulados no estado do Acre entre **(01/01/2018)** a **(17/09/2018)**. Foram registrados **5.165 focos**, segundo dados do satélite de referência (AQUA_M-T), com destaque para os municípios de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Figura 6 – Distribuição dos focos de calor acumulados de **01/01/2018** a **17/09/2018**, no Estado do Acre, segundo (Satélite de referência AQUA_M-T)



O gráfico da **Figura 7** abaixo representa o acumulado do mês de setembro **(01/09/2018)** a **(17/09/2018)** registrado no estado do Acre que corresponde a **3.353 focos** segundo dados do satélite de referência (AQUA_M-T). Os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Brasileia lideram o ranque com maior acumulado de focos de calor.

Figura 7 – Distribuição dos focos de calor acumulados no mês de **01/09/2018** a **17/09/2018** (Satélite de referência AQUA_M-T)






A tabela da **Figura 8** é a consolidação do acumulado do início deste ano (**01/01/2018**) a (**17/09/2018**), por classe fundiária. A análise indica maior ocorrência nas áreas de **Propriedades Particulares, Projetos de Assentamento e Áreas Discriminadas**.

Figura 8 – Distribuição dos focos de calor acumulados de **01/01/2018** a **17/09/2018** por classe fundiária (Satélite de referência AQUA_M-T)

Focos acumulados por classe fundiária no estado do Acre		
	Acumulados do mês Setembro	Acumulados no ano
Área sem Estudo Discriminatório	332	575
Área Arrecadada	123	163
Projetos de Assentamento	789	1184
Áreas Discriminadas	664	1061
Propriedades Particulares	700	1107
Terra Indígena	110	168
Unidade de Conservação	635	907

A **Figura 9** a seguir indica que, no início deste ano (**01/01/2018**) a (**17/09/2018**), o município de **Feijó** apresentou maior acumulado de focos de calor, entretanto o município de **Acrelândia** registrou o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Neste sentido, o município de **Acrelândia, Brasileia, Capixaba, Rodrigues Alves e Bujari** tornam-se prioritários para ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais.

Figura 9 – Ocorrência de focos de calor e densidade por km², por município em **01/01/2018** a **17/09/2018** (Satélite de referência AQUA_M-T)



Fonte: INPE



5. Monitoramento de Focos de Calor nas Unidades de Conservação

A tabela da **Figura 10** é a consolidação do acumulado do início deste ano (**01/01/2018**) a (**17/09/2018**) por Unidade de Conservação. A análise indica maior ocorrência de focos na **Reserva Extrativista do Alto Juruá** e **Reserva Extrativista Chico Mendes**.

Figura 10 – Distribuição dos focos de calor acumulados de **01/01/2018** a **17/09/2018**.


Focos Acumulados - Áreas Naturais Protegidas		
Nome	Acumulados do mês	Acumulados no ano
Reserva Extrativista do Alto Juruá	82	131
Reserva Extrativista do Alto Tarauacá	28	45
Área de Proteção Ambiental Amapá	1	3
Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema	50	73
Parque Estadual Chandless	1	1
Reserva Extrativista Chico Mendes	346	390
Floresta Estadual do Antimary	32	46
Área de Proteção Ambiental Irineu Serra	0	0
Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste	4	8
Floresta Nacional Macauã	0	0
Floresta Estadual Mogno	14	26
Estação Ecológica Rio Acre	0	0
Floresta Estadual Rio Gregório	5	32
Floresta Estadual Rio Liberdade	4	22
Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade	15	39
Floresta Nacional Santa Rosa do Purus	6	9
Floresta Nacional São Francisco	0	0
Área de Proteção Ambiental São Francisco	6	7
Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança	6	7
Parque Nacional Serra do Divisor	35	68



6. Risco de Fogo Previsto

A **Figura 11** é a consolidação da previsão do risco de fogo gerado em **17/09/2018**, entre 12 UTC e 18 UTC. O princípio do Risco de Fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação (INPE).

Figura 11 – Risco de Fogo para o estado do Acre em 18/09/2018



O **alto** e **crítico** risco de fogo diminui sua intensidade e deverá localizar-se em pontos isolados do Oeste, municípios de destaque são Cruzeiro do Sul, Tarauacá, M. Thaumaturgo e no Leste temos Sena Madureira e Assis Brasil.

O risco **baixo** e **mínimo** risco predomina em maior parte do Estado, destacando Santa Rosa do Purus, Feijó e Porto Acre. O risco **médio** deverá localizar-se em áreas isoladas no Estado, do centro e oeste.


De acordo com a Previsão do Sistema de Proteção da Amazônia - Sipam, a umidade relativa do ar deve chegar a valores próximos a 25%. Assim vale ressaltar que a orientação é evitar o uso do fogo, sob pena de ocorrência de incêndios descontrolados.



7. Monitoramento de Focos de Calor – Áreas Críticas

Esta análise é elaborada para o município que apresenta maior quantidade de **focos acumulado nas últimas 24 horas por todos os satélites** disponíveis no banco de dados de queimadas do Inpe. Os dados de **focos são coletados às 09h00 do dia anterior (17/09/2018) até as 09h00 do dia atual (18/09/2018)**, processados em uma grade matricial que representa uma área de 1 km² e posteriormente classificados em uma escala de cor, demonstrando o local de maior concentração de queimadas.

Figura 12 – Mapa de classificação focos de calor



A **Figura 12** demonstra que no **município de Tarauacá**, foi a localidade que apresentou a maior concentração de focos na área de 1 km². As cores no mapa indicam a quantidade de focos agrupados em locais que **corresponde a área de floresta e área aberta** com base nos dados do Sistema de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal – PRODES. De acordo com a classificação fundiária do Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE, os focos foram detectados em **área de Propriedade Particular e Discriminada**.



8. Monitoramento de Cicatriz de Queimadas

Através do Sistema de Captação de Imagens Multiespectrais (MSI), do satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia (ESA) foi capturada imagem (de cor verdadeira) das áreas atingidas (ou cicatrizes) por queimadas que ocorreram na **área urbana do município de Rio Branco**.

A imagem do Sentinel-2 baseia-se tanto nas observações de luz do espectro visível, como de ondas curtas, de infravermelho e de infravermelho próximo.

A **Figura 13** demonstra a **extensão das áreas queimadas que aparece delimitada na cor vermelha**.

O mapa abaixo mostra o acumulado de cicatrizes de **queimadas delimitadas de 26/06 a 09/09/2018**.

26/06/2018: 614,49 Hectares

01/07/2018: 95,35 Hectares

06/07/2018: 282,72 Hectares

11/07/2018: 307,52 Hectares

16/07/2018: 109,40 Hectares

26/07/2018: 680,84 Hectares

25/08/2018: 473,16 Hectares


30/08/2018: 239,52 Hectares

04/09/2018: 178,42 Hectares

09/09/2018: 638,50 Hectares

2.910,08 Hectares
Área Queimada

Figura 13 – Mapa de classificação cicatriz de queimadas em Rio Branco - AC






9. Qualidade do Ar

A concentração de PM2.5 para cada localidade é estimado no primeiro nível do modelo, ou seja, o nível em que vive o ser humano. As máximas concentrações de PM2.5 estão associadas tanto às regiões urbanas devido às fontes veiculares e indústrias e regiões com focos de queimadas e incêndios florestais.

Figura 14 – Mapa de material Particulado CPTEC/INPE em 18.09.2018



A **Figura 14** mostra a previsão, por modelo numérico, da concentração de material particulado no dia **18/09/2018** até as **09h00**, com valores variando de 10 a 170 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Nas regiões que compõe o **Oeste** apresentam condições que variam entre *Boa* a *Péssimo*. O **Leste** indica condições que variam de *Boa* a *Ruim (grupo de Risco)*. Para a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para partículas de até 2,5 μm^2 .

Estima-se que **33.001 toneladas de monóxido de carbono (CO)** foram emitidas por queimadas e fontes urbano/industriais no **Acre** no dia **17/09/2018**.




10. Qualidade do Ar – Rio Branco

O gráfico da **Figura 15** demonstra a concentração de PM 2,5 às 09h00 do dia anterior (**17/09/2018**) até 09h00 dia atual (**18/09/2018**) na área urbana do município de Rio Branco. As leituras foram obtidas através de equipamento de monitoramento da qualidade do ar disponibilizado pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC, os dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

Figura 15– Gráfico de material Particulado PM 2,5

Material Particulado Fino PM 2,5



No dia **17/09/2018**, a **máxima concentração de material particulado** ocorreu às 23h55m, com valor de **54,13 µg/m³**.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – EPA), a concentração média de PM2.5 superiores a valores de 89 µg/m³ em 1-3 horas já são considerados nocivos a grupos de risco (pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idoso e as crianças).

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 µg/m³ para partículas de até 2,5 µm/m², na média, para 24 horas de exposição e de 10 µg/m³ para média anual.



11. Glossário

Siglas Institucionais

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais

CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

ESA - Agência Espacial Europeia

GTPCS - Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

NOAA - Administração Oceânica e Atmosférica Nacional

OMS - Organização Mundial de Saúde

Siglas Técnicas

AQUA_M-T - Satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor a série temporal ao longo dos anos

ISS - Índice Integrado de Seca

MSI - Sistema de Captação de Imagens Multiespectrais

PM2.5 – Material fino particulado

PRODES - Sistema de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal

RF - Risco de Fogo

TSM - Temperatura da Superfície do Mar

ZEE - Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ – Micrômetro por metro cúbico